



Hva innebærer behandling med Cartrophen?

Din veterinær har anbefalt Cartrophen. Cartrophen virker gjennom å påvirke de underliggende årsakene til artrosen som medfører lindring av smerte samt økt grad av smertefrie bevegelser. Behandlingen består av én injeksjon per uke i 4 uker. Deretter skjer etterbehandling i henhold til det program veterinæren anbefaler for akkurat din hund.

Forekommer bivirkninger?

I sjeldne tilfeller kan brekninger forekomme i etterkant av den første injeksjonen. Hunden kan virke noe deprimert i 1-2 dager og ha mindre appetitt. Disse bivirkningene går over av seg selv og trenger ikke behandling. Hvis du opplever noe som gjør deg urolig, ta kontakt med din veterinær.

Hvorfor er det viktig å fullføre behandlingen?

Cartrophen påvirker sykelige forandringer i leddene, blant annet ved å stoppe brusknedbrytelsen og gjennom stimulering av leddvæske. Denne prosessen er tidskrevende og med en for tidlig avbrutt behandling kan det medføre en redusert effekt av legemidlet.

Veterinærens stempel:

Timebestilling	Dato	Kl
1ste injeksjon:		
2nde injeksjon:		
3dje injeksjon:		
4deinjeksjon:		

Osteoartritt/ osteoartrose



Din hund har fått
foreskrevet Cartrophen



Interfarm as, Dølasletta 5, 3408 Tranby
Tel 67581130, post@interfarm.no





Hvilke symptomer bør jeg være spesielt oppmerksom på hos min hund?

Artrose medfører smerte, ubehag, og på sikt minsker den livskvaliteten for din hund. Vær oppmerksom på:

1. om Din hund begynner å røre seg mindre enn før, er mindre lysten på å leke, hoppe eller gå i trapper.
2. om Din hund halter, blir hengende etter på tur, eller har vanskelig for å reise seg; særlig om morgenen.
3. om Din hund er mer irritert enn før, eller skriker av smerte ved berøring
4. om Din hund overdrevent slikker eller tygger rundt et spesielt ledd
5. om Din hund har vanskeligheter med å finne nattero.

Symptomer på artrose er varierende og kommer ofte snikende langsomt. De ovenfor nevnte symptomene er de vanligste og lettest synlige.

Alt ettersom sykdommen utvikler seg blir symptomene tydeligere. Jo tidligere du kommer i gang med behandling jo bedre for dyret. Rådfør deg med din veterinær

Enkle forandringer i hjemmet som kan gjøre det lettere for hunden:

I milde tilfeller og tidlig i sykdomsprosessen kan enkle endringer lindre smerten og ubehaget hos hunden:

1. Hold hunden normalvektig. Overvekt belaster leddene unødig.
2. Forsiktig mosjon anbefales. Kraftig lek bør unngås, det kan forverre tilstanden.
3. Hold hunden tørr og unngå at den hviler på trekkfulle steder.
4. Sørg for at hunden alltid har en varmt og behagelig sted å ligge.

Er det ikke bare eldre hunder som får artrose?

Risikoen for kroniske leddproblemer øker med stigende alder, men også unge individer kan rammes av artrose. Det kan være som en følge av skader så som korsbåndsskader eller et resultat av medfødte forstyrrelse av skjelett og ledd; for eksempel hofteleddsdyplasi eller osteokondrose.

Medisinsk behandling er nødvendig og gir lindring/heling ved flertallet av disse tilstandene.

Man regner med at 1 av 5 voksne hunder lider av kronisk leddinflammasjon.

Hvordan kan min veterinær lindre smertene for min hund?

Foruten de foran nevnte forbedringer i omsorg kan ulike former av medisinsk behandling tilbys for hunder med artrose. I tillegg til medisinsk behandling kan fysioterapi for eksempel i form av svømmetrening, varmebehandling, laser etc gi en forbedring av tilstanden. En kombinasjon av ulike behandlinger gir vanligvis best resultat.